

Name:	
Klasse/Jahrgang:	

Kompensationsprüfung
zur standardisierten kompetenzorientierten
schriftlichen Reife- und Diplomprüfung bzw.
zur standardisierten kompetenzorientierten
schriftlichen Berufsreifeprüfung

Juni 2026

Angewandte Mathematik (BHS)

Berufsreifeprüfung Mathematik

Kompensationsprüfung 4
Angabe für **Kandidatinnen und Kandidaten**

Hinweise zur Kompensationsprüfung

Sehr geehrte Kandidatin, sehr geehrter Kandidat!

Die vorliegende Angabe zur Kompensationsprüfung umfasst vier Aufgaben, die unabhängig voneinander bearbeitbar sind.

Jede Aufgabe umfasst drei nachzuweisende Handlungskompetenzen.

Die Vorbereitungszeit beträgt mindestens 30 Minuten, die Prüfungszeit maximal 25 Minuten.

Als Hilfsmittel dürfen Sie die vom zuständigen Regierungsmitglied für die Klausurarbeit freigegebene Formelsammlung für die SRDP in Angewandter Mathematik verwenden. Weiters ist die Verwendung von elektronischen Hilfsmitteln (z. B. grafikfähiger Taschenrechner oder andere entsprechende Technologie) erlaubt, sofern keine Kommunikation (z. B. via Internet, Intranet, Bluetooth, Mobilfunknetzwerke etc.) und kein Zugriff auf Eigendaten möglich ist. Um zu gewährleisten, dass ausschließlich eigenständige Leistungen erbracht werden, ist jegliche Verwendung KI-basierter Anwendungen bzw. Software, sowohl online als auch offline, unzulässig.

Beurteilung

Jede Aufgabe wird mit null, einem, zwei oder drei Punkten bewertet. Insgesamt können maximal zwölf Punkte erreicht werden.

Beurteilungsschlüssel für die Kompensationsprüfung

Gesamtanzahl der nachgewiesenen Handlungskompetenzen	Beurteilung der mündlichen Kompensationsprüfung
12	Sehr gut
10–11	Gut
8–9	Befriedigend
6–7	Genügend
0–5	Nicht genügend

Viel Erfolg!

Aufgabe 1

Edelweißhütte

- a) Klaus und Harald gehen mit ihren Kindern auf die Mariazeller Bürgeralpe und kehren in der Edelweißhütte ein.


Klaus bezahlt für 3 Grießschmarrn und 5 Jugendgetränke insgesamt € 27,80.

Ein Grießschmarrn ist um € 1,80 teurer als ein Jugendgetränk.

g ... Preis für einen Grießschmarrn in €

j ... Preis für ein Jugendgetränk in €

- 1) Berechnen Sie g und j .
- b) Von der Edelweißhütte aus sieht Klaus die Erzherzog-Johann-Warte unter dem Höhenwinkel α (siehe nachstehende nicht maßstabgetreue Abbildung).



- 1) Stellen Sie eine Formel zur Berechnung der Entfernung L auf. Verwenden Sie dabei H , h und α .

$L =$ _____

- c) Bei der Rückfahrt bezahlt Harald aufgrund eines Preisnachlasses von 20 % für eine Fahrkarte für die Mariazellerbahn nur € 17,60.

Er behauptet: „Ohne Preisnachlass hätte die Fahrkarte € 22 gekostet.“

- 1) Überprüfen Sie nachweislich, ob Haralds Behauptung richtig ist.

Aufgabe 2

Blobbing

Bei der Wassersportart *Blobbing* wird mithilfe eines Sprunges einer Person auf ein im Wasser treibendes Luftkissen eine andere, auf diesem Luftkissen liegende Person, der sogenannte *Blobber*, in die Luft geschleudert.

- a) Die Funktion h beschreibt näherungsweise die Höhe eines bestimmten Blobbers über der Wasseroberfläche in Abhängigkeit von der Zeit.

$$h(t) = -5 \cdot t^2 + 11,3 \cdot t + 1,5$$

t ... Zeit in s mit $t = 0$ für den Zeitpunkt des Wegschleuderns des Blobbers

$h(t)$... Höhe des Blobbers über der Wasseroberfläche zur Zeit t in m

- 1) Berechnen Sie, wie lange sich dieser Blobber nach dem Wegschleudern über der Wasseroberfläche befindet.

Nach der Zeit a (in s) hat dieser Blobber seine maximale Höhe erreicht und nach der Zeit b (in s) taucht er ins Wasser ein.

- 2) Ergänzen Sie die Textlücken in den nachstehenden Sätzen durch Ankreuzen des jeweils zutreffenden Satzteils so, dass richtige Aussagen entstehen.

Der Ausdruck _____ ① _____ gibt die mittlere Änderungsrate der Höhe des Blobbers (in m/s) bis zum Erreichen des Maximums an.

Der Ausdruck _____ ② _____ gibt die momentane Änderungsrate der Höhe des Blobbers (in m/s) beim Eintauchen ins Wasser an.

①	
$\frac{h(b) - h(a)}{b - a}$	☐
$\frac{h(a) - h(0)}{a}$	☐
$\frac{h(a) - h(0)}{h(a)}$	☐


②	
$h'(a)$	☐
$h'(b)$	☐
$h'(0)$	☐

- b) Die Flugbahn einer bestimmten Blobberin nach dem Wegschleudern kann näherungsweise durch den Graphen der quadratischen Funktion f beschrieben werden.

x ... horizontale Entfernung vom Startpunkt der Blobberin in m

$f(x)$... Höhe der Blobberin über der Wasseroberfläche in der horizontalen Entfernung x in m

Im Punkt P hat diese Blobberin ihre maximale Höhe erreicht (siehe nachstehende Abbildung).




- 1) Skizzieren Sie im obigen Koordinatensystem den Graphen der Ableitungsfunktion f' .

Aufgabe 3

Ski

Ein bestimmtes Unternehmen produziert verschiedene Modelle von Skiern.

- a) In der nachstehenden Abbildung ist der Graph der linearen Kostenfunktion K für das Modell A dargestellt.



- 1) Ermitteln Sie mithilfe der obigen Abbildung die Steigung der Funktion K . Geben Sie dabei die zugehörige Einheit an.

Für die zugehörige Erlösfunktion E gilt:

$$E(x) = a \cdot x^2 + b \cdot x$$

Der maximale Erlös in Höhe von 97 300 GE wird bei einer Menge von 340 ME erzielt.

- 2) Erstellen Sie ein Gleichungssystem zur Berechnung der Koeffizienten a und b .

- b) Die zeitliche Entwicklung des Preises für ein Paar Skier des Modells B kann modellhaft durch die Funktion p beschrieben werden.

$$p(t) = 320 \cdot e^{-0,13 \cdot t} + 295$$

t ... Zeit in Monaten mit $t = 0$ für den Zeitpunkt der Markteinführung

$p(t)$... Preis für ein Paar Skier des Modells B zur Zeit t in Euro

- 1) Berechnen Sie die momentane Änderungsrate des Preises für ein Paar Skier des Modells B 4 Monate nach der Markteinführung. Geben Sie dabei die zugehörige Einheit an.

Aufgabe 4


Mensch ärgere Dich nicht

Das Brettspiel *Mensch ärgere Dich nicht* wird mit Spielfiguren und einem fairen 6-seitigen Würfel gespielt.

- a) Ein Spieler kann mit dem Spiel beginnen, wenn beim Würfeln das Ereignis E_1 eintritt.
 E_1 ... „der Spieler benötigt höchstens 3 Versuche, um einen Sechser zu werfen“

1) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit $P(E_1)$.

- b) In der nachstehenden Abbildung sind acht aufeinanderfolgende Felder des Spielbretts und die Zugrichtung der Spielfiguren dargestellt.



Auf diesen Feldern stehen zwei rote Spielfiguren (R) und zwei grüne Spielfiguren (G). Auf den restlichen Feldern stehen keine Spielfiguren.

Ein Spieler würfelt einmal und darf im Anschluss mit einer der beiden roten Spielfiguren der gewürfelten Augenzahl entsprechend nach rechts ziehen.

Es wird das nachstehende Ereignis E_2 betrachtet:

E_2 ... „es wird eine Augenzahl gewürfelt, mit der eine der beiden roten Spielfiguren auf eines der beiden Felder mit den grünen Spielfiguren bewegt werden kann“

1) Begründen Sie, warum gilt: $P(E_2) = \frac{1}{2}$

- c) Der Würfel wird 10-mal geworfen.

Die Anzahl der geworfenen Sechser kann durch die binomialverteilte Zufallsvariable X modelliert werden.

Mithilfe des nachstehenden Ausdrucks soll die Wahrscheinlichkeit berechnet werden, dass bei 10-maligem Würfeln mindestens 2 Sechser geworfen werden.

$$P(X \geq 2) = \sum_{k=2}^{10} \binom{10}{\boxed{}} \cdot \left(\frac{1}{6}\right)^{\boxed{}} \cdot \left(\frac{5}{6}\right)^{\boxed{}}$$

1) Tragen Sie die fehlenden Ausdrücke in die dafür vorgesehenen Kästchen ein.